

Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

21^e Mémoire (1)

ARACHNIDES

Par EUGÈNE SIMON.

[Planche 9]

Séance du 28 octobre 1891

Familles des Uloboridæ, Zoropsidæ, Dictynidæ, Œcobiidæ, Filistatidæ, Sicariidæ, Leptonetidæ, Oonopidæ, Dysderidæ, Caponiidæ, Prodidomidæ, Drassidæ, Palpimanidæ et Zodariidæ.

ARANEÆ VERÆ

Sectio 1. ARANEÆ CRIBELLATÆ.

Familia ULOBORIDÆ.

1. *Dinopis spinosus* Marx, *Pr. Acad. N. S. Phil.*, 1889, t. XI, p. 343. — Caracas!, San-Esteban!.

Espèce répandue dans le sud des États-Unis (Alabama, Florida) et dans les Antilles.

(1) Voir 15^e mémoire (*Coléoptères—Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16^e mémoire (*Arachnides : Chernetes [Pseudoscorpiones]*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497, pl. 9, 10, 11 et 12. — 17^e mémoire (*Hyménoptères*, par Robert du Buysson et T. A. Marshall), Annales 1892, p. 53, pl. 3 et 4. — 18^e mémoire (*Coléoptères—Hétéromères*, par L. Fairmaire), Annales 1892, p. 77. — 19^e mémoire (*Coléoptères—Colydiides*, par A. Grouvelle), Annales 1892, p. 98, 5 fig.; — 20^e mémoire (*Hémiptères—Hétéroptères*, 1^{re} partie : *Capsides*, par O. M. Reuter), Annales 1892, p. 391.

Ann. Soc. ent. Fr., 1892. — Avril 1893.

Gen. **Uloborus** Walck.*Conspectus specierum.*

1. Abdomen apice crasse unituberculatum. Oculi medii antichi inter se spatio diametro oculo non latiore sejuncti. **geniculatus**.
 — Abdomen apice haud tuberculatum, seu, sæpius, grosse bituberculatum. Oculi antichi spatio diametro oculo duplo latiore sejuncti 2.
2. Vulva haud foveolata, tuberculis binis geminatis munita.... 3.
 — Vulva foveola postice marginata impressa..... 4.
3. Oculi medii aequales, aream antice quam postice multo angustioribus occupantes. Femora antice parallela. Tibiæ haud cristatæ. Abdomen breve, antice altissimum.. **campestratus**.
 — Oculi medii aream subparallelam occupantes, antichi posticis paulo majores. Femora antica intus convexa et tibiæ valde cristatæ. Abdomen longum, antice bituberculatum... **ægrotus**.
4. Vulvæ fovea postice margine dilatato, transversim subquadrato et apice fisso limitata. Area oculorum mediorum antice quam postice angustior..... **republicanus**.
 — Vulvæ fovea postice margine angusto et recto limitata. Area oculorum mediorum antice quam postice haud multo angustior..... 5.
5. Abdomen humile, longe oblongum. Tibiæ haud cristatæ. **servulus**.
 — Abdomen antice altissimum et crasse bituberculatum. Tibiæ antice cristatæ..... **semplumosus**.

2. **U. geniculatus** Oliv., *Encycl. méth.*, II, 1789, p. 214 (*Aranea*).
 — *Uloborus zozis* Walck., *Apt.*, II, 1841, p. 231, tab. xx, fig. 2. — *U. Latreillei* Thorell, *Vet. Ak. Forh.*, XV, 1858, p. 197. — *Orithya Williæ* Blackw., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 3^e sér., III, 1858, p. 331. — *Ulob. domesticus* Dolesch., *Act. Soc. Sc. Ind. Neerl.*, V, 1859, p. 46, tab. vii, fig. 2. — *U. borbonicus* Vinson, *Aran. Réunion*, etc., 1864, p. 258, tab. 1, fig. 3. — *U. zozis* L. Koch, *Ar. Austr.*, 1872, p. 221, tab. xix, fig. 3. — *U. zozis* Thorell, *Rag. Mal.*, II, 1878, p. 130. — *U. geniculatus* Thorell, 1890.

Très commun dans toutes les parties du Venezuela que j'ai explorées. Il habite exclusivement l'intérieur des maisons, où il file sa toile dans les angles des plafonds et des fenêtres.

3. **U. republicanus** E. Sim., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. 12.

Espèce sociable, extrêmement commune dans la forêt de San-Esteban ; je l'ai aussi observée à Corosal. — Pour ses mœurs singulières, *cf.* *Ann.* 1891, p. 5, pl. 3 et 4.

4. **U. ægrotus**, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-olivaceus, parte thoracica linea media testacea abbreviata notata, pilis plumosis pronis albidis, fulvisque paucis intermixtis, vestitus. Oculi postici sat magni, æqui, lineam validissime procurvam formantes, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antichi ad marginem clypei siti, medii lateralibus evidenter majores. Area mediorum paulo longior quam latior et subparallela, antice quam postice haud multo angustior. Abdomen angustum et longum, antice sat convexum, minute et subacute bituberculatum, fulvo-testaceum, utrinque et subtus nigricans, supra vitta media obscuriore, postice evanescente, notatum, albo rufuloque pubescens. Sternum nigrum, parce albido fulvoque plumosum. Pedes fulvo-olivacei, antichi, apice excepto, infuscati, reliqui plus minus fusco-variati et subannulati, valde inæquales, antichi (metatarsis tarsisque exceptis) multo robustiores, femore intus convexo et rude piloso, tibia, in parte apicali et supra et subtus, crasse nigro-cristata. Vulva tuberculis binis testaceis obtusis et geminatis munita.

Caracas !, San-Esteban !.

5. **U. campestratus**, n. sp. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax parte cephalica luteo-testaceus, thoracica nigricans, pilis plumosis niveis pronis crebre vestitus. Oculi postici parvi, subæquales, in lineam valde recurvam, medii inter se quam a lateralibus evidenter remotiores. Oculi antichi prope marginem clypei siti, medii lateralibus paulo majores. Area oculorum mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice evidenter angustior. Abdomen in parte prima validissime tumidum, apice obtusissime bilobatum, postice valde declive et attenuatum, supra albo-opacum, in lateribus et subtus late fuscum sed crebre testaceo-guttulatum, pilis niveis albis vestitum et pilis longioribus fasciculatis, series duas formantibus, supra ornatum. Mamillæ nigræ, apice olivacæ, supra sat late nigro-cinctæ. Sternum nigrum, parce albo-plumosum. Pedes mediocres, pallide lutei, femore 4ⁱ paris in parte apicali patella tibiaque nigris, metatarso tarsoque rufescentibus, metatarso 4ⁱ paris apice olivaceo-annulato, tibia 4ⁱ paris subtus ad apicem pilis cinereis longioribus dense cristata. Metatarsus 4ⁱ paris supra longe

depresso et calamistro dimidium articulum superante. Vulvæ margo fulvus, elevatus, in medio fissus, minute et subacute bituberculatus.

♂. Long. 5,1 mill. — Cephalothorax multo brevior et latior, utrinque ample rotundus, impressione transversa latissima, in medio leviter angulata, notatus, fuscus vel niger, in parte cephalica macula maxima triquetra antice subacuta, in parte thoracica vitta longitudinali angustiore, fulvo-testaceis ornatus. Oculi postici minores, in lineam minus recurvam. Oculi medii antiqui majores et prominentiores. Abdomen minus, simpliciter obtusum, albidum, vitta longitudinali lata et sinuosa, apicem haud attingente, utrinque vitta laterali sinuosa vittaque ventrali lata nigris notatum. Sternum nigrum. Pedes mediocres, fulvi, olivaceo-annulati, tibiis anticis fere omnino fuscis, tibiis metatarsisque 4ⁱ paris apice intense nigro-annulatis. Pedes-maxillares breves et robusti, luridi, tarso bulboque rufescentibus; femore brevi et subrecto; patella convexa, vix longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, paulo latiore, antice arcuata et longe ciliata; tarso bulboque magnis et subglobosis.

Var. ♀. — Abdomen album, mamillis rufulis, nigro-cinctis. Sternum fusco-olivaceum. Cephalothorax pedesque omnino luridi, tibiis anticis nigro-variatis, tarsis metatarsisque anticis rufescentibus.

Var. ♀. — Omnino album, metatarsis tarsisque anticis rufescentibus. Caracas !, La Guaira !, San-Esteban !.

6. **U. semiplumosus**, n. sp. — ♀. Long. 4 mill. — Nigerrimus, cephalothorace pilis simplicibus et longis albidis parce munito, abdomine pedibusque pilis brevibus simplicibus obscure fulvis, pilis plumosis niveis parce intermixtis, vestitis, tibiis anticis annulo testaceo minuto submedio, tibiis posticis annulo basilari simili ornatis, metatarsis tarsisque olivaceis, his fusco-annulatis, chelis femoreque pedum-maxillarium olivaceis. Oculi ordinarii, fere ut in *U. penicillato* E. Sim. ordinati, sed medii antiqui reliquis evidentius majores. Abdomen in parte prima validissime tumidum, apice obtusissime et parum distincte bilobatum, postice longe declive, attenuatum et subacuminatum, subtus leviter convexum. Pedes mediocres, robusti, sed metatarsis tarsisque gracilibus, nec penicillatis nec cristatis, tarsis anticis longis metatarsis haud multo brevioribus, metatarso 4ⁱ paris in dimidio basilari depresso et calamistro in dimidio apicali cylindraceo et recto. Vulvæ fovea magna, ovato-transversa, postice margine fulvo recto et integro limitata.

Var. ♀. — Cephalothoracis pars thoracica in medio testaceo-notata.

Abdomen antice, in declivitate, albidum, postice linea transversa sinuosa albida ornatum. Pedes testaceo-annulati.

Caracas !, San-Esteban !.

7. **U. servulus**, n. sp. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax atrovirescens, crasse et parce albo-pilosus, parte cephalica postica macula subquadrata, thoracica maculis binis elongatis obliquis et subgeminatis albo-testaceis notatis. Oculi medii postici inter se quam a lateralibus evidenter remotiores. Oculi medii antiqui reliquis oculis majores. Area mediorum antice quam postice haud multo angustior. Abdomen longe oblongum, antice posticeque attenuatum et obtuse truncatum, in medio sat convexum et obtusissime nodosum, haud tuberculatum, supra albido-opacum, linea media exili obscuriore notatum, apice nigrum et macula subapicali transversa albidior ornatum, subtus convexum et omnino nigrum. Mamillæ superiores nigrae, inferiores testaceae intus infuscae. Sternum atrovirescens. Pedes luridi, numerose et latissime olivaceo vel atrovirescenti-annulati, in femoribus tibiisque anticis annulis subconfluentibus. Vulva processu testaceo rufulo semicirculari nec inciso nec tuberculato, supra foveolato et marginato notata.

San-Esteban !, Caracas !.

Espèce remarquable par ses mœurs, car elle vit en parasite dans le réseau supérieur de la toile d'un *Cyrtophora* (*C. nympa*, sp. inedita). Sa toile, établie entre les mailles de celle de son hôte, est régulièrement orbiculaire et traversée longitudinalement par un *stabilimentum* exclusivement formé de petits débris d'Insectes, et ressemblant à celui des toiles de certains *Cyclosa*.

8. **Miagrammopes corticeus**, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax atro-olivaceus, pilis plumosis albis dense vestitus, angustus et multo longior quam lator, antice posticeque truncatus, antice, ad oculos, parum ampliatus et pone oculos leviter transversim impressus. Oculi longe ante medium siti, parvi et æquales, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores sed spatio inter medios et laterales diametro oculo plus quadruplo latiore. Abdomen angustum et longissimum, subparallelum, antice truncatum, postice paululum attenuatum et obtusum, haud prominens, fulvo-testaceum, albo-pilosum, superne punctis nigris per paria ordinatis et utrinque in lateribus maculis nigris tribus (macula 2^a reliquis multo majore, elongata atque obliqua) notatum. Partes oris, sternum, pedesque obscure fulvo-olivacea, pilis plumosis albis vestita, femoribus tibiisque anticis supra infuscatis, metatarsis

posticis supra nigricantibus. Pedes antici reliquis multo longiores et crassiores, femoribus tibiisque validis et cylindraceis, metatarsis leviter curvatis, apice attenuatis, pilis simplicibus et longis albidis crebre hirsutis, metatarso 4ⁱ parvis tibia fere duplo brevior, crasso et valde compresso, supra longe excavato, calamistro $\frac{2}{3}$ longitudinem articuli occupante, munito, subtus spinis obtusis, leviter lanceolatis numerosis et regulariter seriatis usque ad basin armato, tarso subtus aculeis minoribus seriatis armato. Pedes-maxillares breves chelæque fulvo-testacei.

♂. Long. 4,2 mill. — Cephalothorax brevior, postice magis attenuatus. Abdomen brevius. Tibia antica superne leviter deplanata et inaequalis atque aculeis validissimis longis et acutis fere inordinatis et numerosis (15-20) armata, metatarsus anticus ad basin crassus et supra aculeis similibus paucis instructus, ad apicem valde attenuatus et aculeis minoribus parce armatus. Pedes-maxillares fulvo-olivacei; femore brevi robusto et leviter arcuato; patella paulo latiore quam tibia; tibia patella brevior, supra apophysi parva fulva erecta et acuta munita; tarso bulboque sat magnis et subglobosis.

Var. ♀. — Cephalothorax in medio albo, in lateribus fulvo-pilosus. Abdomen utrinque fulvo-pubescent, vitta media obscuriore sed albidius pilosa supra ornatum, maculis nigris lateralibus distinctissimis. Pedes, praesertim antici, obscuriores, pilis metatarsorum anticorum fulvis.

San-Esteban !.

A *M. scopario* E. Sim. (ex insula S^t-Vincentii), cui valde affinis est, differt praesertim metatarsis anticis inordinate pilosis, haud cristatis, abdomine postice subacuminato haud producto.

9. *M. bambusicola*, n. sp. — ♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, utrinque late infuscatus et confuse marginatus, oculis late nigro-cinctis, pilis plumosis pronis, in medio albis, versus marginem flavidis, vestitus, latior quam longior sed multo brevior quam in praecedente, parallelus et postice recte sectus, ad oculos leviter dilatatus, antice attenuatus et obtuse truncatus, utrinque, pone oculos, leviter impressus. Oculi longe ante medium siti, medii inter se quam a lateralibus multo remotiores, sed spatio inter medios et laterales diametro oculi saltem triplo latiore, laterales mediis paulo majores et late tuberculati. Abdomen sat longe oblongum, antice truncatum, in medio sensim ampliatum et convexum, postice declive, attenuatum et subacuminatum

fere ut in *Uloboro*, supra albo-opacum, leviter testaceo-reticulatum et punctis nigris parvis sex, per paria ordinatis, notatum, interdum utrinque vitta marginali fusca lata et flexuosa ornatum, subtus fulvo-testaceum. Sternum pedesque fulvo-olivacea, sternum inter coxas anticas paulo latius quam in præcedente et subparallelum, patellis, apice tibiarum metatarsisque 4^1 paris infuscatis. Pedes 1^1 paris reliquis multo longiores et crassiores, normales, haud insigniter pilosi. Metatarsus 4^1 paris tibia tantum $1/3$ brevior, supra longe excavatum et calamistro tertiam partem apicalem superante munitus, subtus aculeis obtusis numerosis, versus apicem sensim densioribus et basin haud attingentibus, armatus, tarsus inferne aculeis minoribus seriatis munitus.

♂. Long. $\frac{1}{2}$ mill. — Cephalothorax abdomenque paulo breviora. Tibia antica cylindracea, supra aculeis sat longis et acutis regulariter biseriatis (5-7 vel 4-6) armata, metatarsus aculeis multo minoribus et biseriatis munitus. Pedes-maxillares albo-testacei, tarso bulboque rufescentibus; femore brevi; patella latiore quam longiore; tibia patella longiore, apice leviter attenuata sed obtusissima et longe albo-ciliata apophysi carente; tarso bulboque sat magnis et subglobosis.

A *M. Trailli* Cambr., cui sat affinis est, differt imprimis abdomine brevior et convexior, supra albo, haud albo-maculato, metatarsis anticis pilis longis et leviter clavatis haud munitis, metatarsorum posteriorum serie aculeorum basin articuli fere attingente (in *M. Trailli* dimidium apicale tantum occupante).

Corosal I, Colonie Tovar I, San-Esteban I.

Extrêmement commun sur les Bambous.

10. *M. albo-cinctus*, n. sp. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax pallide flavo-testaceus, utrinque ad oculos late fusco-rufulo maculatus, pilis plumosis pronis albis vestitus, brevis, haud multo longior quam latior, postice leviter attenuatus et recte sectus, antice ad oculos valde dilatatus sed ad frontem valde attenuatus et obtuse truncatus. Oculi paulo ante medium siti, medii inter se quam a laterilibus multo remotiores, sed spatio inter medios et laterales diametro oculi plus quadruplo latiore. Laterales mediis paulo majores, late tuberculati et valde prominenti. Abdomen oblongum, antice truncatum, dein sensim ampliatum et convexum, ad apicem valde declive et subacuminatum, lacte flavidum, supra vittis longitudinalibus albo-opacis interruptis et punctis nigris parvis sex, per paria ordinatis, ornatum. Partes oris sternumque flavida; sternum sat latum et coxæ anticæ distantes. Pedes fulvo-flavidi,

femoribus, tibiis metatarsisque annulis latis et flexuosis albidis ornatis, breves et robusti, antici reliquis robustiores sed haud insigniter longiores, normales, metatarso 4ⁱ parvis tibia non multo brevior, supra longe excavato et calamistro tertiam partem apicalem articuli attingente, subtus serie spinarum obtusarum, basin haud attingente, munito, tarso subtus aculeis seriatis minoribus munito.

Colonie Tovar !.

Familia ZOROPSIDÆ.

Gen. *Acanthoctenus* Keyserl.

1. *A. spinipes* Keyserl., *Verh. z. b. G. Wien*, 1876, p. 693, tab. II, fig. 61. — Cette espèce, décrite de Bogota, est commune au Venezuela : je l'ai trouvée à Caracas, Corosal, San-Esteban ; je l'ai reçue aussi de l'Ecuador (Zamora), ce qui lui donne un habitat des plus étendus. — Keyserling n'a décrit que la femelle.

♂. Long. 13 mill. — Pedes-maxillares sat longi ; femore subrecto apice leviter incrassato et pluriaculeato ; patella fere duplo longior quam latiore, leviter ovata, supra, in parte basali, spinis pronis binis armata ; tibia patella paulo longior et gracilior, cylindrata et leviter curvata, prope basin aculeo dorsali, aculeo interiore, aculeoque inferiore longis armata, extus ad apicem, prope basin tarsalem, apophysi nigra sat brevi, simplice, obtuse conica et depressa instructa ; tarso tibia paulo longior, latiore, apice breviter acuminato, extus prope basin ampliatus et subcarinato ; bulbo nigro, ovato et obliquo. — Ab *A. spinigero* Keys., sec. Keyserling, præsertim differt tibia cylindrata, haud ovata, et apophysi terminali antice directa haud perpendiculari.

Familia DICTYNIDÆ.

Gen. *Auximus* E. Sim., *Hist. nat. Ar.* (2^e éd.), I, 1892, p. 239.

1. *A. plagiatus*, n. sp. (pl. 9, fig. 5). — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte thoracica utrinque late obscuriore et lineis radiantibus nigricantibus notata, parte cephalica sat brevi, lata et modice convexa. Oculi postici in lineam procurvam, æqui, sat late et fere æque separati, spatiis diametro oculo plus duplo latioribus inter se distantes. Oculi antici inter se sat distantes, in lineam subrectam ; medii lateralibus plus quadruplo minores. Area mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice angustior. Oculi laterales æquales, oblique elevati, spatio diametro oculi circiter duplo angustiore separati. Clypeus

oculis lateralibus anticis circiter æquilatus. Chelæ robustæ, nigro-rufescentes, læves et nitidæ, transversim subtilissime striolatæ, margine sulci inferiore longe obliquo, dentibus subæqualibus quinque armato, margine superiore dentibus binis remotis sed inter se subcontiguis munito. Abdomen oblongum, supra pallide fusco-testaceum seu cinereum et crebre testaceo-punctatum, in lateribus et postice late obscuriore et nigricante-variaturum, in parte basali macula magna confusa rhomboïdali nigricante ornatum, subtus cinereo-testaceum. Sternum obscuro-olivaceum, versus marginem infuscatum, læve et nitidum, parce pilosum. Pedes mediocres, fulvo-rufuli vel olivacei, femoribus annulis tribus valde sinuosis et dentatis, tibiis metatarsisque annulis binis integris nigricantibus ornatis, aculeis nigris, numerosis et sat longis armati. Plaga vulvæ plus duplo latior quam longior, in medio leviter convexa, minute granosa et olivacea, utrinque attenuata, testacea, depressa et tenuiter rufulo-marginata, ad marginem posticum, in medio, excisa et plagulam parvam nigram transversim triquetram et minute bifoveolatam includens.

Colonic Tovar !.

2. **A. crinitus**, n. sp. (pl. 9, fig. 6). — ♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, sublævis, parce pilosus et in medio setis nigris longioribus seriatis munitus, parte cephalica lata sat brevi et convexa. Oculi postici magni, æqui, lineam valde procurvam formantes, fere æquidistantes et spatiis diametro oculo haud duplo latioribus separati. Oculi antici in lineam plane rectam, inter se appropinquati, medii lateralibus saltem quadruplo minores. Area mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice multo angustior. Oculi laterales æqui, oblique elevati, spatio dimidio diametro oculo angustiore a sese separati. Clypeus longitudinem oculorum anticorum saltem æquans. Abdomen oblongum, obscuro-cinereum, plus minus nigro-variaturum et punctatum et in parte apicali vittis nigricantibus transversis 4 vel 5, valde angulosis, ornatum. Chelæ, sternum pedesque pallide fusco-rufescentia, lævia et nitida, parce et longe pilosa. Chelarum armatura ut in præcedente. Pedes aculeis dorsalibus femorum longis et gracilibus, aculeis tiliarum et metatarsorum brevioribus. Plaga vulvæ transversa, plus triplo latior quam longior, et valde complicata, utrinque attenuata, depressa et tenuiter rufulo-marginata, in medio plagula nitida obtuse triquetra, utrinque tuberculo sinuoso atque ad marginem posticum plagula transversa marginiformi nigro-nitida notata.

Colonic Tovar !.

3. *Dictyna colombiana* L. Becker, *Ann. Soc. ent. Belg.*, C. R., févr. 1886, XXIV. — ♂. Long. 2,7 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, fere lævis, parce et crasse albo-pubescent. Oculi postici æqui, mediocres et fere æquidistantes, spatiis diametro oculo saltem duplo latioribus separati et lineam vix recurvam formantes. Oculi antici in lineam rectam, subæquales, medii inter se quam a laterilibus paulo remotiores. Area mediorum parallela et paulo latior quam longior. Clypeus area oculorum circiter æquilatus. Abdomen ovatum, parce albo-pubescent, supra fuscum vel nigricans, leviter micans, in medio late dilutius et leviter cupreo-tinctum, punctis impressis biserialis munitum. Sternum fulvo-rufescens, læve et nitidum. Chelæ rufescentes, coriaceæ, intus longitudinaliter emarginatæ. Pedes fulvi, breviter pilosi. Pedes-maxillares fulvi; patella vix longiore quam latiore; tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ longiore ad basin paulo angustiore et cylindrata, supra ad basin apophysi verticali diametro articulo paulo longiore apice nigra et minutissime bifida, armata, tarso magno, late ovato, tibia cum patella simul sumptis longiore.

♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax, sternum pedesque ut in mare, vel sæpius paulo obscuriora. Chelæ haud emarginatæ. Abdomen late ovatum et convexum, supra fuscum vel nigricans, cinereo-pubescent, vitta media testacea albida vel fulva in parte prima latissima et utrinque obtuse dentata, in parte secunda sensim attenuata et evanescente supra notatum.

Caracas !.

Commun dans les jardins où il file sa toile sur les feuilles.

4. *D. albicoma*, n. sp. — ♂. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte thoracica infuscata et subtiliter coriacea, cephalica crasse et parce albo-pilosa. Oculi postici sat magni, æqui et fere æquidistantes, spatiis diametro oculo haud duplo latioribus separati et lineam vix recurvam formantes. Oculi antici posticis paulo minores, lineam levissime procurvam designantes, medii inter se quam a laterilibus paulo remotiores. Area mediorum paulo latior quam longior, antice quam postice paulo angustior. Clypeus area oculorum circiter æquilatus. Abdomen oblongum, pallide fulvo-lividum, crasse albidopubescent. Sternum aurantiacum, nitidum, parce albo-pilosum. Chelæ fusco-rufescentes, coriaceæ, intus anguste emarginatæ. Pedes-maxillares pedesque omnino pallide fulvi. Pedum-maxillarium patella brevis, vix longior quam latior, tibia brevis patella haud longior sed paulo angustior, supra ad basin apophysi diametro articulo brevior, apice acuta

et antice curvata, armata; tarsus magnus, longe ovatus, tibia et patella, simul sumptis, fere duplo longior.

♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax obscure fusco-rufescens, parte cephalica vix dilutior et crasse albo-pilosa. Chelæ haud emarginatæ. Abdomen late ovatum et convexum, omnino nigricans et breviter albo-pubescent. Pedes-maxillares pedesque omnino luridi.

Var. ♀. — Abdomen testaceum. in parte prima utrinque maculis fuscis obliquis 3 vel 4 maculaque media simili, in parte altera utrinque maculis nigricantibus majoribus tribus, marginem latum designantibus, notatum.

Caracas !, Petare !, San-Esteban !.

5. **D. novempunctata**, n. sp. — ♀. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax lævis, fusco-olivaceus, vitta media lata et dentata, oculos attingente, lutea et crasse albo-pilosa notatus, parte thoracica lineis radiantibus abbreviatis et numerosis nigricantibus munita. Oculi postici parvi, lineam leviter procurvam designantes, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antici in lineam subrectam, fere æquidistantes, medii lateralibus minores. Area mediorum latior quam longior et antice quam postice angustior. Clypeus oculis lateralibus anticis plus duplo jator et oblique porrectus. Abdomen ovatum, convexum, nigrum, albo-pubescent, antice macula semicirculari, dein maculis minoribus quatuor, in series duas subgeminatas ordinatis, postice maculis quatuor subtriquetris et uniseriatis (apicali reliquis majore) albido-testaceis, notatum. Sternum nigro-nitidum. Chelæ ad basin fusco-olivaceæ, ad apicem fulvæ. Pedes-maxillares pedesque sat graciles, omnino luridi.

Petare !.

6. **D. cruciata**, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax lævis, pallide fulvo-rufescens, crasse et parce albo-pilosus, utrinque vitta submarginali latissima leviter infusca notatus. Oculi postici sat parvi, in lineam plane rectam, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi antici æqui, in lineam subrectam (vix procurvam) et equidistantes. Area mediorum paulo latior quam longior et antice quam postice angustior. Abdomen oblongum, fulvo-lividum, parce albo-pilosum, vitta media latissima sed postice valde attenuata et prope medium vitta transversa arcuata cruciata, albo-opaca supra ornatum. Chelæ, sternum, pedes-maxillares pedesque omnino pallide lutea, lævia.

Caracas !.

Gen. **Thallumetus** E. Sim., *Hist. nat. Ar.* (2^e éd.), I, 1892, p. 244.

7. **T. salax**, n. sp. (pl. 9, fig. 7). — ♂. Long. 2,5—3 mill. — Cephalothorax fulvo-olivaceus, sublævis et parce setosus. Oculi postici sat parvi, lineam vix procurvam formantes, medii inter se quam a lateralibus remotiores et spatio, diametro oculo saltem triplo latiore, sejuncti. Oculi antici in lineam rectam, æqui, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores. Area mediorum paulo latior quam longior et antice quam postice paulo angustior. Sternum chelæque fusco-olivacea, lævia et nitida. Abdomen oblongum, supra albo-testaceum, nigricante-marginatum et vittis transversis quinque, in medio late interruptis, notatum, interdum omnino testaceum, seu omnino nigrum, subtus semper obscuro-testaceum, albido-pilosum. Pedes omnino olivacei. Pedes-maxillares olivacei, patella tibiaque nigricantibus; femore crassissimo, subtus ad apicem dilatato et truncato, truncatura, desuper visa, leviter depressa et marginata; patella magna, apice leviter attenuata et obliqua, supra planiuscula; tibia patella circiter æquilonga, elevata et valde insignis, extus late et profunde foveolata, foveola carinula oblique secta, margine superiore incrassata carinata et valde curvata, apice obtusa, leviter producta et minutissime bifida; tarso mediocri, ovato et breviter acuto; bulbo convexo.

Corosal !, La Guaira !, San-Esteban !.

8. **Amaurobius (Titanœca) patellaris**, n. sp. (pl. 9, fig. 8). — ♂. Long. 4.2 mill. — Cephalothorax niger, subtilissime coriaceus et opacus, fulvo-pubescens, parte cephalica longa, lata, subparallela et convexa. Oculi mediocres, in lineam subrectam (vix procurvam), medii a lateralibus quam inter se multo remotiores et spatio diametro oculo latiore separati. Oculi antici in lineam levissime procurvam, fere æquidistantes, medii lateralibus minores. Area mediorum circiter æque longa ac lata et antice quam postice angustior. Spatium inter oculos anticos et posticos diametro oculo angustius. Clypeus oculis lateralibus anticis paulo angustior. Chelæ longæ, parallelæ, in medio leviter depressæ, nigro-opacæ, coriaceæ, transversim rugate et parce granosæ. Abdomen oblongum, nigrum, fulvo-nitido-pubescens. Sternum nigro-olivaceum, læve et nitidum. Pedes sat longi, fulvo-olivacei, femoribus nigris, tibia 4^a paris, præsertim in medio, aculeis robustis inordinatis 7-8 munita, reliquis tibiis metatarsisque cunctis parce et minute aculeatis. Pedes-maxillares fusco-olivacei; femore robusto et arcuato; patella brevi, intus ad apicem apophysi perpendiculari, articulo lon-

giore, acuta et leviter curvata, insigniter armata; tibia patella circiter æquilonga, angustiore atque obliqua, apice leviter biemarginata; tarso magno, breviter ovato, extus quam intus magis dilatato, supra, ad basin, pone articulationem, lobo parvo foveolato munito; bulbo magno et complicato.

♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, sublævis. Oculi postici minores et inter se distantiores, spatio inter medios diametro oculo plus duplo latiore. Oculi medii antici a lateralibus quam inter se evidenter remotiores. Chelæ robustiores, nec depressæ nec granulosaë, transversim parce striatæ. Abdomen magnum, ovatum, nigrum, fulvo-nitido-pubescens. Pedes robustiores et breviores, obscure fulvo-olivacei, femoribus infuscatis, sat longe pilosi, aculeis apicalibus parvis metatarsorum exceptis, mutici. Vulva simplex.

Caracas !, Corosal !, Puerto-Cabello !, San-Esteban !.

Familia **ŒCOBIIDÆ**.

1. **Œcobius navus** Blackw. (pl. 9, fig. 1), *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1859, p. 266 (*Clotho*). — *Œ. navus* E. Sim., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 269. — Commun sur les murailles à Caracas, à La Guaira, à Valencia, etc.; paraît avoir été introduit au Venezuela. Cette espèce est presque cosmopolite; je la possède des îles océaniques, du Japon, de la Nouvelle-Calédonie; elle appartient au premier groupe du genre *Œcobius*.

2. **Œ. concinnus**, n. sp. (pl. 9, fig. 2). — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax latior quam longior, transversim reniformis et utrinque ample rotundus, pallide luridus, pilis crassis longis et pronis albis vestitus, parte cephalica macula magna infuscata fere omnino obiecta, parte thoracica vitta multo angustiore notata, utrinque linea marginali exili, intus quadridentata, et inter vittam mediam et marginalem maculis seriatis arcuatis et elongatis tribus, sæpe confluentibus, et lineam flexuosam formantibus, ornatus. Oculi quatuor nigri aream trapeziformem multo latiore quam longiore et antice quam postice multo angustioribus occupantes, antici posticis plus duplo minores, oculi postici albi, minutissimi, haud angulosi, longi, marginem interiorem oculi nigri siti et postice haud producti. Abdomen breviter ovatum, albidum, crebre cinereo-reticulatum, macula media elongata rhomboïdali et utrinque postice macula majore arcuata et laciniosa nigricante supra notatum, subtus late et parum regulariter nigro-marginatum. Mamillæ subtus olivaceæ, supra nigricantes. Tuber anale longe albido-ciliatum. Sternum

pedesque albido-lurida, femoribus subtus, prope medium, transversim nigro-lineatis et utrinque minute nigro-binotatis, tibiis metatarsisque annulo submedio annuloque subapicali sat angustis nigris et saepe supra interruptis ornatis, tarsis, prope apicem, minute nigro-notatis. Regio epigasteris in medio rufula coriacea et foveola triquetra minute impressa.

♂. Long. 2,5 mill. — Feminae subsimilis. Pedes-maxillares luridi, tarso bulboque fusco-rufalis, femore utrinque nigro-notato, patella supra minute et oblique nigro-maculata; femore robusto et subrecto; patella paulo longiore quam latiore, parallela; tibia patella multo brevior annuliformi; tarso sat magno, ovato et obtuso; bulbo complicato, apophysibus binis nigris et acutis sat longis instructo: apophysi basilari antice arcuata, apicali recta leviter retro directa.

Puerto-Cabello !.

Sur les murailles extérieures des maisons et sur les rochers.

Cette espèce doit former, dans le genre *OEcobius*, un groupe spécial (cf. *Hist. nat. Ar.*, (2^e éd.), I, p. 247).

Familia **FILISTATIDÆ**.

1. **Filistata capitata** Hentz. *Bost. J. Nat. Hist.*, IV, 1842, p. 228, tab. viii, fig. 7. — *Teratodes depressus* C. Koch, *Ar.*, IX, 1842, p. 403, fig. 755. — *Filistata cubacola* Lucas in R. de la Sagra, *Hist. Cuba*, etc., *Art.*, 1853, p. 74, tab. iv, fig. 2. — *Filistata capitata* Keyserl., *Verh. z. b. G. Wien*, 1879, p. 345, tab. iv, fig. 33.

Extrêmement commun dans toutes les localités du Venezuela que j'ai visitées; il couvre de ses toiles, remarquablement grandes et épaisses, les rochers humides, le plafond des hangars et les trous d'arbres; cette toile se termine par un tube de même tissu servant de retraite en s'enfonçant dans un creux ou une fissure.

F. capitata est très répandu dans toute l'Amérique tempérée et tropicale, depuis le sud des États-Unis jusqu'à la République Argentine.

Seccio 2. **ARANEÆ ECRIBELLATÆ**

Familia **SICARIIDÆ**.

1. **Loxosceles rufipes** Lucas, *Mag. Zool.*, cl. VIII, 1836, fig. 6 (*Scytodes*). — *Scytodes omosites* Walck., *Apt.*, I, 1837, p. 273. —

Scytodes rufipes, *læta*, *nigella* Nicolet, in Gay *Hist. Ch., Zool.*, III, 1847, p. 348-350. — *Loxosceles rufipes* Keyserl., *Verh. z. b. G. Wien*, 1877, p. 214, tab. VII, fig. 5.

Caracas !, San-Esteban !. — Dans les maisons.

Espèce répandue dans toute l'Amérique du Sud.

2. *Scytodes fusca* Walck., *Apt.*, I, 1837, p. 272. — *S. guyanensis* Taczan., *Hor. Soc. ent. Ross.*, X, 1873, p. 106. — *S. fusca* E. Sim., *Pr. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 568.

Caracas !, Petare !, Corosal !, Puerto-Cabello !, La Guaira !, Valencia !.

Espèce répandue dans les Antilles, en Guyane et au Brésil.

3. *S. bajula* E. Sim., *Pr. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 569.

Caracas !, La Guaira !, San-Esteban !, Puerto-Cabello !.

Je l'ai décrit de l'île Saint-Vincent.

4. *S. longipes* Lucas, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1845, p. 71, tab. 1, fig. 2. — *S. marmorata* Taczanowski, *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1873, p. 106. — *S. longipes* Keyserl., *Verh. z. b. G. Wien*, 1877, p. 210, tab. VII, fig. 3. — *S. Taczanowskii* Thorell, *Rag. Mal.*, etc., IV, 1890, p. 301 (note). — *S. longipes* E. Sim., *Pr. Zool. Soc. Lond.*, 1891.

Caracas !, San-Esteban !, Corosal !. — Dans les maisons.

Répandu dans toute l'Amérique du Sud et les Antilles.

5. *S. lineatipes* Taczan., *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1873, p. 107. — E. Sim., *Pr. Zool. Soc. Lond.*, 1891.

Caracas !, Petare !, Corosal !, Colonie Tovar !, San-Esteban !. — Existe aussi aux Antilles et en Guyane.

Très commun.

6. *S. luteola*, n. sp. — ♀. Long. 7,5 mill. — Cephalothorax breviter ovatus, postice sat convexus, sublævis, parce et breviter nigropilosus, luridus, fusco-variatus, regione frontali utrinque infuscata, pone oculos medios linea exili abbreviata et utrinque vittis duabus multo latoribus et flexuosis, interiore medium haud attingente, exteriore usque ad apicem fere ducta, arcuata et postice convergente, prope medium lineolis binis abbreviatis subcontiguïs, utrinque linea marginali angusta et dentata vittaque submarginali latiore valde triflexuosa notatus. Margo clypei leviter emarginatus, utrinque ad angulum convexus. Oculi antici contigui. Clypeus oculis anticis saltem dimidio lator.

Abdomen globosum. albido-testaceum, zonis transversis obscurioribus seu nigricantibus supra notatum, subtus in medio late et leviter infuscatum, impressionibus validis, inter se appropinquantis, transversim semicircularibus et intus crasse marginatis, rufulis. Sternum, partes oris pedesque lurida. Sternum immaculatum. Pedes mediocres et graciles, femoribus anticis subtus infuscatis, posticis annulo fusco subapicali notatis, tibiis metatarsisque ad apicem minute fuscis.

Caracas !.

A *S. Bertheloti* Lucas, cui sat affinis est, præsertim differt cephalothorace humiliore, pedibus leviter fusco-annulatis et impressionibus ventralibus majoribus et transversim minus distantibus.

7. **S. guttipes**, n. sp. (pl. 9, fig. 13). — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax breviter ovatus, postice valde convexus, sublavis, parce et sat longe pilosus, pallide luridus, fusco-variatus. regione frontali et clypei ad marginem punctata, pone oculos medios lineis binis parallelis et rectis, medium fere attingentibus, antice, inter oculos laterales, coalescentibus et maculam angulatam formantibus. utrinque, prope lineas dorsales, serie punctorum 6-7, dein vitta latiore antice abbreviata et bifida, postice ampliata et intus valde curvata, ad marginem anteriorem ramulos sat longos et angustos, antice oblique directos, emitte, ad marginem serie punctorum lineaque exili submarginali flexuosa et inter lineas submarginales et lineas dorsales linea valde flexuosa angulos acutos tres designante ornatus. Margo clypei leviter emarginatus, utrinque paulum convexus. Oculi antici inter se juxta contigui et intus recti. Clypeus oculis anticis angustior. Abdomen globosum, albidum, supra lineolis exillimis transversis nigris, anticis valde curvatis, mediis levius curvatis, posticis subrectis et in medio late interruptis notatum, in lateribus zonis punctatis munitum, subtus concolor. Sternum, partes oris pedesque albida. Sternum læve. linea marginali exili, interrupta et antice intus uncata et in parte anteriore maculis parvis nigris quatuor biseriatis ornatum. Chelæ vitta nigra, apicem haud attingente, ornata. Pars labialis ad basin utrinque tenuiter nigro-marginata. Pedes longi et graciles, coxis cunctis minute nigro-bipunctatis, femore minute nigro-guttulatis et subtus lineolis transversis et sinuosis decoratis, tibiis ad basin atque ad apicem sat anguste sed intense nigro-annulatis, in medio parce nigro-notatis, metatarsis apice minute fuscis. Pedum-maxillarium femore subtus, tibia patellaque supra ad apicem, tarsoque intus minute nigro-notatis. Impressiones ventrales parvæ distinctæ.

♂. Long. 5 mill. — Feminae fere similis sed pedibus multo longioribus. Pedes-maxillares albidī, minute nigro-variati; femore subrecto, apicem versus leviter attenuato; tibia patella longiore, leviter ovata; tarso spina gracili longa et recta producto; bulbo piriformi, spina lobo longiore, subrecta, in parte apicali leviter incrassata et utrinque carinam lamellosam insigniter gerente, carina anteriore altera paulo majore et striata.

Caracas !, San-Esteban !.

Species lineis punctatis cephalothoracis (inter lineas ordinarias), pedibus nigro-guttulatis, et spina bulbi apice carinata eximie distincta.

Familia LEPTONETIDÆ.

Gen. **Theotima** E. Sim. — *Theoclia* E. Sim., *Pr. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 567 (nom. præocc. Douglas, 1887).

1. **T. radiata** E. Sim., *loc. cit.*, 1891, p. 568.

Caracas !, Colonie Tovar !, San-Esteban !.

J'ai décrit cette espèce de l'île Saint-Vincent.

2. **Ochyrocera janthinipes**, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax fulvo-viridis, vitta media lata et integra, postice leviter attenuata, et utrinque vitta marginali latissima, nigris, notatus. Clypeus oculique fere ut in *O. arietina* E. Sim. Abdomen convexum, viride, supra maculis sæpe confluentibus, biseriatis, utrinque vitta lata et obliqua, subtus maculis tribus, minus distinctis, nigris, ornatum. Sternum nigricante-olivaceum, vitta dilutior dentata notatum. Pedes longissimi fere *Pholci*, femoribus versus basin valde incrassatis et longe fusiformibus, reliquis articulis gracillimis, metatarsis tarsisque filiformibus et flexuosis, coxis trochanteribusque exceptis, late violacei, femoribus ad apicem infuscatis sed annulo subapicali annuloque apicali minutissimo, albidis, notatis, patellis nigricantibus, tibiis annulo subbasilari annuloque apicali parvo albidis ornatis.

♂. Long. 3 mill. — Feminae similis. Pedes-maxillares olivaceo-virides; femore longo, gracili, versus basin attenuato et curvato; patella parva, nodiformi; tibia patella plus duplo longiore, vix crassiore, versus basin leviter attenuata; tarso tibia vix longiore, ad basin crassiore et leviter ovato, sed apice acutissimo et curvato; bulbo fere ut in *O. arietina* sed spina lobo haud multo longiore.

San-Esteban !.

Dans les détritns humides de la forêt. La femelle porte ses œufs dans ses chélicères à la manière des *Pholcus*. Les œufs sont gros, violacés et retenus ensemble par quelques fils.

3. *O. vesiculifera*, n. sp. — ♀. Long. 3,2 mill. — Cephalothorax lurido-testaceus, vitta media fusco-nigricante, antice lata, postice angustiore et leviter dentata, vittisque marginalibus latis notatus. Clypeus vitta media lata nigricante ornatus. Oculi fere ut in *O. janthinipes* sed clypeo paulo minus porrecto. Abdomen convexum, lurido-virescens, paulo ante medium maculis obliquis elongatis binis, in medio macula unica ovata, postice vittis transversis abbreviatis 4 vel 5, sæpe confluentibus, et utrinque in parte apicali vitta lata et obliqua, nigricantibus, ornatum, subtus postice sensim infuscatum. Sternum fuscum in medio paulo dilutius. Pedes ut in præcedente sed obscure fulvi, femoribus ad basin atque ad apicem, tibiis ad apicem infuscatibus sed annulo apicali minuto albido notatis.

♂. Long. 3 mill. — Feminae similis. Pedes-maxillares olivaceo-luridi; femore sat longo et gracili; patella parva nodiformi; tibia patella circiter duplo longiore et leviter ovata; tarso tibia vix $\frac{1}{3}$ longiore, ad basin sat crasso, ad apicem abrupte angustiore, spiniformi, acuto et curvato; bulbo sat late ovato, rufulo, ad apicem leviter attenuato, spina gracili bulbo longiore et antice plicata munito.

Colonie Tovar !.

Commun dans les détritns végétaux de la forêt.

Familia OONOPIDÆ.

Gen. *Hytanis*, nov. gen.

A *Gamasomorpha*, cui valde affinis et subsimilis est, tantum differt laminis-maxillaribus et rectis fere *Dysdera*, parte labiali saltem duplo longioribus, cephalothorace sternoque paulo longioribus, hoc postice minus late truncato, pedum patellis cunctis longioribus et inter se subsimilibus (mas ignotus).

1. *H. oblonga*, n. sp. — ♀. Long. 2,6 mill. — Cephalothorax late rufescens, versus marginem sensim infuscatus, subtiliter et dense coriaceo-granulosus, oculis anguste nigro-cinctis. Oculi postici contigui, in lineam rectam, medii lateralibus paulo majores et late ovati. Oculi antici posticis saltem $\frac{1}{3}$ majores, spatio dimidio diametro oculo an-

gustiore a sese distantes. Clypeus oculis anticis paulo angustior. Abdomen longe oblongum, læte rufescens, nitidum, scuto dorsali sat dense et regulariter punctato-impresso et pilis albis plumosis vestito, scuto ventrali parcius punctato. Sternum læte rufescens, nitidum, parcissime et minutissime punctatum. Pedes sat breves, pallide luridi, coxis trochanteribusque rufulo-tinctis, pilis cinereis crassis parce vestiti.

Puerto-Cabello !.

Un seul exemplaire trouvé sous une pierre à l'embouchure de la rivière salée. Cette espèce a sans doute un habitat très étendu, car je l'ai reçue du Haut-Amazone (Sao Paulo de Olivença) par M. de Mathan.

Gen. **Disderina** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 556.

2. **D. spinigera** E. Sim., *loc. cit.*, p. 558.

Très commun au Venezuela : je l'ai observé à Caracas, Corosal, la Colonie Tovar, San-Esteban, la Cumbre de Valencia, etc. — Se trouve aussi aux Antilles, je l'ai décrit de l'île Saint-Vincent.

3. **D. principalis** Keyserl., *Verh. z. b. G. Wien*, 1881, p. 296 (*Oonops*). — *Dysderina principalis* E. Sim., *loc. cit.*, p. 557.

Commun au Venezuela : je l'ai observé à Caracas, à Corosal et à San-Esteban. — Cette espèce est décrite de Bogota par Keyserling ; je l'ai aussi indiquée de l'île Saint-Vincent.

4. **D. armata**, n. sp. (pl. 9, fig. 9). — ♂. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax læte rufo-castaneus, versus marginem sensim infuscatus, latus et convexus, crebre coriaceus sed versus marginem lineis radiantibus flexuosis lævioribus ornatus. Area oculorum compactilis, latitudinem frontis totam occupans. Oculis quatuor postici subæquales et inter se juxta contigui, lineam plane rectam formantes. Oculi antici posticis majores, subrotundi, spatio diametro oculo plus duplo angustiore a sese distantes. Clypeus oculis anticis angustior. Scuta abdominalia rufula, sublævia et parce pilosa, dorsali subintegro, ventrali dimidium ventrem superante. Sternum rufulum, coriaceo-granulosum, haud clathratum. Pedes sat longi et robusti, fulvo-rufuli, femoribus anticis inferne aculeis gracilibus longis uniseriatis quatuor et intus, in parte apicali, aculeis similibus binis armatis, tibiis inferne leviter deplanatis et utrinque aculeis longissimis sat robustis pronis et paululum elevatis quatuor (apicalibus reliquis minoribus) et metatarsis aculeis similibus binis armatis. Pedes-maxillares parvi et graciles ; tibia patella paulo longiore,

ereti; tarso cum bulbo patella cum tibia simul sumptis paulo longiore et latiore, sed sat anguste ovatis; bulbo cylindraceo, apice truncato et spinis gracilibus binis (superiore longiore et arcuata) instructo.

Caracas !.

Un seul mâle.

Cette espèce diffère de *D. spinigera* E. Sim. par ses scutum abdominaux beaucoup plus prolongés en arrière, son céphalothorax offrant des zones rayonnantes lisses, comme chez *D. principalis* Keyserl., sa patte-mâchoire plus grêle avec le bulbe beaucoup plus petit. Elle diffère de *D. principalis* Keyserl. par son sternum uniformément granuleux sans lignes cloisonnées, le fémur de sa patte-mâchoire grêle, nullement claviforme, etc.

Gen. **Cinetomorpha** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 558.

5. **C. puberula**, n. sp. (pl. 9, fig. 10-10 a). — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax rufo-castaneus, versus marginem sensim infuscatus et fere niger, breviter ovatus, convexus, antice valde attenuatus et obtusus, omnino regulariter et crebre coriaceus, in medio pilis crassis paucis albidis ornatus. Oculi antici ovati et obliqui, spatio diametro oculo fere duplo latiore separati. Clypeus oculis anticis paulo latior. Abdomen magnum, late ovatum, scuto dorsali uniformiter coriaceo-opaco, pilis albis crassis et lanceolatis consperso, scute ventrali antice, in regione epigasteris, obscure fusco-rufulo sublaevi, postice dilatior et rufulo, tenuiter coriaceo et longe albido-piloso. Sternum fusco-castaneum, in medio laeviter inaequale et granosum, versus marginem laevius. Pedes late fulvo-aurantiaci, parce pilosi.

♂. Long. 3 mill. — Feminae similis sed sterno postice laevi et nitido. Pedes-maxillares luridi, breves et sat robusti; femore crasso; patella longiore quam latiore; tibia patella brevior et angustior; bulbo albido, mediocri, apice oblique secto, sed apophysi nigricante longissima flexuosa et leviter carinata spina apicali parva et curvata munita, instructo.

Caracas !, San-Esteban !.

6. **C. towarensis**, n. sp. — Long. 3 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, versus marginem sensim infuscatus, sat longus et modice convexus, omnino regulariter et subtiliter coriaceus. Oculi antici obliqui, spatio diametro oculo duplo latiore sejuncti. Clypeus oculis anticis paulo latior. Abdomen ovatum, depressiusculum, scuto dorsali integro,

nigro-nitido, sublævi, antice utrinque leviter rugoso, parce et breviter albido-piloso, scuto ventrali, mamillas fere attingente et postice truncato, nigro-nitido, minute et parce rugoso, in regione epigasteris leviter rufulo convexo et inæquali. Sternum paulo longius quam latius, rufescens, nitidum et læve, tantum in medio subtiliter coriaceum. Pedes sat breves, fulvo-aurantiaci. Pedes-maxillares fere ut in *C. puberula* E. Sim. fulvi, apophysi bulbi longissima et intus curvata nigricante.

Colonie Tovar !.

7. **C. silvestris**, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax rufo-castaneus, versus marginem leviter infuscatus, breviter ovatus et convexus, antice attenuatus atque obtusus, omnino crebre et tenuiter coriaceus et in medio setis nigris paucis erectis munitus. Oculi ut in *C. puberula* E. Sim. Abdomen magnum, scuto dorsali uniformiter et subtiliter coriaceo, pilis albidis tenuibus et brevibus consperso, scuto ventrali lævi et nitido parce et longius albido-piloso, antice in regione epigasteris leviter ruguloso. Sternum omnino coriaceo-rugosum. Pedes luridi ut in *C. puberula* E. Sim.

Colonie Tovar !.

Gen. **Opopæa** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 560.

8. **O. deserticola** E. Sim., *loc. cit.*, p. 560, tab. XLII, fig. 5.

La Guaira !, Puerto-Cabello ! ; dans les endroits les plus secs.

Cette espèce habite presque toutes les régions chaudes du globe, je l'ai trouvée dans le Sahara algérien, en Égypte, en Arabie, aux îles Philippines, et je l'ai décrite de l'île Saint-Vincent (Antilles).

Une seconde espèce du genre, *Opopæa cupida* Keyserling, est décrite de Colombie.

Gen. **Triæris** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 561.

9. **T. stenaspis** E. Sim., *loc. cit.*, p. 561.

Caracas !, San-Esteban !. — J'ai décrit cette espèce de l'île Saint-Vincent (Antilles).

Gen. **Scaphiella** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 561.

10. **S. scutiventris**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Cephalothorax sat longe ovatus, parum convexus, lævis et nitidissimus, fulvo-rufescens, anguste et confuse fusco-marginatus. Oculi anguste nigro-cincti. Oculi

postici æqui, contigui, = lineam subrectam. Oculi antici reliquis haud multo majores, spatio dim. > diametro oculo vix angustiore inter se distantes. Sternum scutumque abdominale rufescentia, lævia et nitidissima, marginibus scuti haud coalescentibus; abdomen supra albo-membranaceum. Pedes flavo-rufuli. parce pilosi, breves et robusti, femoribus compressis et clavatis, metatarsis anticis tarsis vix longioribus. Pedes-maxillares breves et robusti; femore lato, subclaviformi; tibia patella æquilonga; tarso tibia cum patella haud brevior, latiore atque ovato, intus ad basin setis robustis nigris munito.

Caracas !.

11. **S. cymbalaria** E. Sim., *loc. cit.*, p. 561.

La Cumbre de Valencia !.

Se trouve aussi à l'île Saint-Vincent.

12. **S. itys**, n. sp. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax late fulvo-rufescens, ad marginem anguste infuscatus, omnino lævis et nitidissimus. Area oculorum nigra. Oculi postici contigui, lineam vix procurvam designantes, medii lateralibus paulo majores, oculi antici reliquis majores inter se contigui. Abdomen sat anguste ovatum, longum, scuto dorsali scutoque ventrali integris fulvo-rufulis et nitidissimis omnino obtectum. Chelæ haud acuminatæ. Pedes-maxillares pedesque omnino rufescentes. Pedes-maxillares femore sat robusto et leviter clavato; patella tibiaque brevibus et subæquis; tibia ad apicem leviter ampliata et minute emarginata; tarso bulboque maximis, late ovatis.

Caracas !.

A *S. cymbalaria* E. Sim. differt cephalothorace omnino lævi et chelis haud acuminatis, a *S. scutiventris* E. Sim. differt oculis anticis reliquis majoribus et inter se contiguis.

Gen. **Onops** Templ.

Conspectus specierum.

1. Abdomen supra fuscum, nigricante-reticulatum, maculis albis ornatum, subtus omnino albidum..... **figuratus**.
- Abdomen concolor, albo-testaceum seu lividum..... 2.
2. Pedes-maxillares feminae femore patella tibiaque intus longe et regulariter spinosis..... **spinimanus**.
- Pedes-maxillares feminae parce pilosi..... 3.

3. Pedes longi fere ut in *Loxoscele*... **loxoscelinus**.
 — Pedes normales..... 4.
 4. Tibiæ metatarsique antici subtus aculeis seriatis validis et longis pronis et leviter elevatis armati. Pedum-maxillarium maris femur crassum et clavatum, bulbus angustus teretiusculus..... **pulicarius**.
 — Tibiæ metatarsique antici subtus setis biseriatis parum distinctis armati. Pedum-maxillarium maris femur gracile et subrectum, bulbus latissimus globoso-piriformis. **globimanus**.

13. **O. spinimanus** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 563.

Caracas !. — Habite aussi l'île Saint-Vincent.

14. **O. globimanus** E. Sim., *loc. cit.*, p. 563.

Caracas !, Corosal !, Valencia !. — Habite aussi l'île Saint-Vincent.

15. **O. pulicarius** E. Sim., *loc. cit.*, p. 564.

Caracas !, San-Esteban !. — Habite aussi l'île Saint-Vincent.

16. **O. figuratus** E. Sim., *loc. cit.*, p. 564.

Caracas !, Colonie Tovar !. — Habite aussi l'île Saint-Vincent.

17. **O. loxoscelinus**, n. sp. — ♀. Long. 3,5 mill. — Luridus, lævis, oculis anguste nigro-cinctis, abdomine testaceo-livido, subtus, ad apicem, prope mamillas, minute fusco-binotato. Cephalothorax brevis, postice altus et fere abrupte declivis, fronte obtusa et recte truncata. Area oculorum latitudinem frontalem totam occupans. Oculi sat magni, subæquales, medii inter se juxta contigui, breviter ovati et intus recti, laterales subrotundi, antici spatio diametro oculo paulo angustiore a sese distantes. Pedes-maxillares graciles, parce pilosi. Pedes graciles, insigniter longi (fere ut in *Loxoscele*), tibiis metatarsisque anticis subtus aculeis tenuissimis pronis et minute elevatis biseriatis (in tibiis 5-5, in metatarsis 3-3) instructis.

Colonie Tovar !.

Gen. **Telechius**, nov. gen.

Ab *Oonope* differt cephalothorace brevior et fronte obtusa paulo latiore, area oculorum fronte paulo angustiore et paulo magis transversa, oculis lateralibus posticis a mediis distinctius separatis, clypeo oculis anticis latiore et leviter porrecto, pedibus robustioribus et bre-

viioribus, tibiis metatarsisque anticis aculeis vel setis spiniformibus biserialis subtus instructis, tarsis anticis metatarsis haud vel vix brevioribus, sterno haud longiore quam latiore, convexo, postice late truncato et coxis posticis globosis spatio diametro articulo latiore a sese distantibus.

Le type de ce genre est une espèce encore inédite du nord de l'Afrique, dont je donne la description en note (1).

18. **T. micans**, n. sp. — Long. 2,5 mill. — Cephalothorax, sternum pedesque fulvo-rufescentia, nitida et laevia. Cephalothorax brevis et latus. Area oculorum sat transversa, latitudine frontali evidenter angustior. Oculi sat parvi, medii subrotundi, intus leviter deplanati et inter se juxta contigui, laterales a mediis distincte separati, antico postico paulo majore, laterales antici spatio diametro oculi evidenter latiore inter se distantes. Abdomen nigro-nitidum, leviter micans, parce albidopilosum, subtus, in parte basali, late dilutius et testaceum. Tibiæ metatarsique quatuor anteriores inferne aculeis setiformibus longis et pronis biserialis armata (in tibiis aculeis 3-4 vel 4-4, in metatarsis 2-2 vel 3-3). Pedes-maxillares sat graciles, parce et sat breviter pilosi.

Colonie Tovar !.

Gen. **Oonopinus**, nov. gen.

Ab *Oonope* differt cephalothorace longius ovali, humiliore, supra deplanato, sterno longiore, postice minus attenuato et latius obtuso, coxis posticis subglobosis, latius separatis, pedibus brevioribus et, præsertim anticis, crassioribus, crasse pilosis sed muticis.

Le type de ce genre est *Oonops angustatus* E. Sim. (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 239), de la région méditerranéenne occidentale.

19. **O. aurantiacus**, n. sp. (pl. 9, fig. 11). — ♀. Long. 2,5—2,8 mill. — Læte flavo-aurantiacus, lævis et nitidus, oculis anguste nigro-cinctis, partibus oris leviter infuscatis, abdomine albo-testaceo sed regione epi-

(1) **T. barbarus**, n. sp. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax breviter ovatus, convexus, fulvo-aurantius, crebre et tenuiter coriaceo-granulosus, in medio levior et setis nigris paucis erectis munitus. Clypeus oculis anticis latior et leviter porrectus. Abdomen breviter ovatum, albo-testaceum, parce cinereo-setosum. Sternum fulvo-aurantium, crebre et subtiliter coriaceo-rugosum. Pedes parum longi, robusti, albedo-luridi, subpellucentes, tibiis anticis inferne setis spiniformibus biserialis 3-3 armatis, tarsis metatarsis vix brevioribus.

Algiria : djebel Mahadid !.

gasteris lutea leviter coriacea et in medio minute infuscata. Cephalothorax elongatus, parum convexus. Area oculorum latitudinem frontalem fere $\frac{1}{3}$ angustior, transversa et, superne visa, saltem $\frac{1}{3}$ latior quam longior. Oculi quatuor postici in lineam valde recurvam, medii inter se juxta contigui et intus recti, laterales a mediis distincte separati, oculi antici reliquis paulo majores, obliqui et inter se spatio diametro oculo haud angustiore sejuncti. Pedes breves, femoribus latis et compressis, parce et breviter pilosi.

♂. Long. 2,5 mill. — Feminae subsimilis sed laminis maxillaribus intus emarginatis, nigro-cinctis et dentatis. Pedes-maxillares breves; femore brevi, late dilatato et clavato; patella magna globosa; tibia patella brevior et angustior collum formante; tarso tibia paulo longiore; bulbo longo sed angusto, teretiusculo, apice leviter et sensim attenuato. prope apicem intus processu fusco et obtuso atque ad apicem setis plurimis nigris insigniter armato.

Caracas !, Colonie Tovar !, San-Esteban !.

Gen. **Stenoonops** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 564.

20. **S. scabriculus** E. Sim., *loc. cit.*, p. 564.

San-Esteban !.

J'ai décrit cette espèce de l'île Saint-Vincent.

21. **S. egenulus**, n. sp. — ♀. Long. 2 mill. — Læte flavo-aurantiacus, chelis et partibus oris leviter infuscatis, oculis anguste nigro-cinctis, abdomine albo-testaceo. Cephalothorax humilis, angustus, supra deplanatus, lævis et nitidissimus, parce et longe cinereo-setosus. Area oculorum parva, fronte fere triplo angustior. Oculi antici reliquis haud multo majores, ovati, obliqui et spatio diametro oculo paulo angustior a sese distantes. Sternum læve, parce et longe cinereo-setosum. Pedes breves, femoribus latis et compressis, parce et breviter pilosi. Pedes-maxillares parce pilosi.

San-Esteban !.

Gen. **Orchestina** E. Sim., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 237 (note).

22. **O. saltabunda**, n. sp. (pl. 9, fig. 12). — ♀. Long. 1,8 mill. — Cephalothorax lurido-olivaceus, oculis nigro-cinctis, nitidus et glaber, brevis et postice valde convexus, fronte obtusa et lata. Area oculorum transversa, latitudinem frontis fere totam occupans. Oculi medii reli-

quis paulo majores, inter se juxta contigui et intus recti, laterales subrotundi, aequi et contigui, antici a mediis vix separati. Clypeus oculis anticis latior, oblique porrectus. Abdomen globosum, pallide testaceum, supra leviter infuscatum. Chelæ, partes oris sternumque lurido-olivacea, nitida. Pedes luridi, mutici, longi, femoribus, præsertim posticis, crassis et elevatis, reliquis articulis tenuibus.

♂. Long. 1,5 mill. — Feminae subsimilis. Pedes-maxillares luridi; femore gracili, brevi et subrecto; patella minutissima nodosa; tibia magna, femore vix brevior et multo crassior, late ovato et apice attenuato; bulbo, reliquis articulis cunctis vix brevior et plus triplo latiore, late piriformi, apice simpliciter et longe attenuato, subrecto et subacuto.

Caracas!, Colonie Tovar!.

Familia **DYSDERIDÆ.**

1. **Ariadne towarensis**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. — Cephalothorax ovatus, fusco-piceus, subtilissime coriaceus, nitidus, parce setosus. Oculi sat magni, subæquales et rotundi, medii inter se contigui, utrinque laterales contigui, spatium inter medios et laterales diametro oculo evidenter latius. Clypeus oculis lateralibus anticis latior. Abdomen oblongum, teretiusculum, atro-testaceum, sat longe cinereo-pubescent. Chelæ breves et robustæ, fusco-piceæ, nitidæ, nec rugatæ nec rugosæ. Sternum pallide fusco-ravidum, nitidissimum. Pedes antici posticis longiores et robustiores, pallide fusco-ravidi vel olivacei, postici luridi, femore 1ⁱ paris apice incrassato, intus aculeo erecto, supra aculeis brevioribus 3-4 armato, patella mutica, tibia intus et extus aculeis parvis quatuor uniseriatis et subtus aculeis longioribus 4-4 armata, metatarso subtus aculeis robustioribus biseriatis 5-6 instructo sed aculeis lateralibus carente; tibia 2ⁱ paris utrinque aculeis lateralibus parvis tribus et subtus aculeis biseriatis 4-3 (serie aculeorum anteriore partem apicalem tantum occupante) instructa; tibia 3ⁱ paris aculeis tribus uniseriatis; metatarso aculeis binis subtus munitis. Pedes 1ⁱ paris omnino mutici.

Colonie Tovar!.

2. **A. tubicola**, n. sp. — ♀. Long. 8-9 mill. — Cephalothorax ovatus, pallide fusco-piceus, subtilissime coriaceus, nitidus, parce setosus. Oculi mediocres, medii lateralibus paulo minores inter se valde appropinquati sed distincte separati, utrinque laterales contigui, spatium

inter medios et laterales diametro oculo evidenter latius. Clypeus oculis anticis haud latior. Abdomen oblongum, teretiusculum, supra atro-testaceum, subtus fulvum, parce cinereo-pubescent. Chelæ breves et robustæ, fusco-piceæ, læves et nitidæ. Sternum fulvum, nitidissimum. Pedes luridi, metatarsis tarsisque apice anguste fuscis, femore 1ⁱ paris apice incrassato, intus aculeo erecto, longo et sinuoso, supra aculeo minore, munito, patella mutica, tibia subtus aculeis validis et longis sed inæqualibus (3 et 5 reliquis minoribus) et leviter curvatis, biseriatis (5-6), aculeisque lateribus interioribus binis parvis instructa sed aculeis lateralibus exterioribus carente, metatarso subtus aculeis validis similibus 5-5 armato, tibia metatarsoque 2ⁱ paris fere similiter aculeatis (sed aculeis inferioribus paucioribus); tibia 3ⁱ paris aculeo unico, metatarso aculeis tribus uniseriatis subtus munitis; pedes 4ⁱ paris omnino mutici.

Caracas !.

Familia CAPONIIDÆ.

Gen. **Nops** Mac Leay.

1. **N. glauca** Van Hasselt, *Tijdschr. v. Entom.*, XXX, 1887, p. 67. — ♂. Long. 6 mill. — Feminae fere similis, cephalothorace obscurius rufocastaneo, crebrinus et validius coriaceo-rugoso, pedibus paulo longioribus. Pedes-maxillares pallide luridi; femore sat gracili et subrecto; patella vix longiore quam latiore; tibia patella saltem 1/3 longiore, versus apicem leviter et sensim ampliata; tarso tibia cum patella simul sumptis longiore, superne viso parallelo apice obtuso et supra, prope apicem, area parva ovata scopulata notato, bulbi lobo magno, globosopyriformi, spina lobo brevior cylindrata, antice valde curvata et subplicata, apice truncata et minute mucronata.

Caracas !, Puerto-Cabello !, Valencia !.

2. **N. maculata**, n. sp. — ♀. Long. 8 mill. (valde immatura). — Cephalothorax rufescens, macula oculari nigra, subtiliter et crebre coriaceus. Abdomen longe oblongum, supra cinereo-viride, linea media integra leviter nodosa, utrinque antice linea longitudinali abbreviata, dein maculis tribus obliquis nigris ornatum. Sternum pedesque rufescentia, sternum leve, subtilissime striolatum.

Caracas !.

N. Branickii Taczanowski verisimiliter valde affinis sed certe distincta.

3. *N. sublævis*, n. sp. (pl. 9, fig. 14). — ♂ ♀. Long. 5-6 mill. — Cephalothorax sternumque obscure fulvo-rufescentia, macula oculari nigra. Abdomen cinereo-viride. Pedes lurido-rufescentes, coxis, trochanteribus, metatarsis tarsisque dilutioribus. A *N. glauca*, cui valde affinis est, presertim differt cephalothorace subtilius coriaceo, sterno paulo latiore, sublævi et nitido (in *N. glauca* valde coriaceo-rugoso), bulbi spina multo longiore lobo haud brevior, paulo graciliore sed apice obtusa, et minute bifida, prope medium antice plicata. — Femina mari similis.

Colonie Tavar !.

Gen. **Caponina** E. Sim., *Proceed. Zool. Soc. Lond.*, 1891, p. 573.

4. *C. longipes*, n. sp. (pl. 9, fig. 15). — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax fulvo-ravidus, subtiliter coriaceus, macula oculari nigra notatus. Abdomen pallide cinereo-testaceum, parce pilosum. Sternum, pedes-maxillares pedesque lurido-rufescentia. A *N. glauca* differt cephalothorace multo latiore sed antice valde attenuato et fronte angusta, sterno multo latiore et sublævi, pedibus longioribus et gracilioribus, pedum-maxillarium tarso latius ovato, bulbo globoso spina usque ad basim gracillima fusca apice acuta, extus incurva.

Caracas !, Valencia !, San-Esteban !

Familia **PRODIDOMIDÆ**.

Gen. **Prodidomus** Hentz, 1847. — *Miltia* E. Sim., 1869.

1. *P. nigricauda*, n. sp. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax, sternum pedesque lævia, lutea, parce cinereo-pilosa. Abdomen testaceum, supra infuscatum, albo-pubescent et ad marginem anticum pilis nigris paucis munitum ; mamillæ albidæ, fusulis lateralium supra atris subtus albidis. Area oculorum paulo latior quam longior, antice infuscata, oculi antici nigri, reliquis vix majores, reliqui oculi albi angulosi et utrinque contigui, postici anticis paulo minores, obliqui et convergentes, sed inter se distincte separati. Pedes antici reliquis robustiores, femoribus latis, compressis et subclavatis. Mamillæ laterales fusulis penicillatis articulo basali paulo longiores. Pedum-maxillarium tarsus tibia crassiore teretiusculus atque obtusus. Plagula vulvæ rufula, subrotunda et nitida parce pilosa et antice minute impressa.

Corosal !.

2. **P. opacithorax**, n. sp. — ♀. Long. 3.5 mill. — Præcedenti valde affinis et subsimilis sed cephalothorace subtilissime coriaceo et opaco, area oculorum haud latiore quam longiore, utrinque oculis laterilibus tribus æqualibus et contiguïs duobus anticis subrotundis vel leviter angulosis, postico elongato angusto et obliquo, mamillis laterilibus fusulis penicillatis articulo basali longioribus supra obscure cinereis, subtus albidis, area vulvæ magis transversa, antice testacea et leviter foveolata, postice rufula, nitida et in medio paululum depressa, facile distinguendus.

San-Esteban !.

Familia **DRASSIDÆ**.

Gen. **Lygromma**, nov. gen.

Cephalothorax ovatus, laevis, stria media tenui et longa munitus. Oculi sex nocturni, aream compactilem fronte multo angustiore occupantes, oculi quatuor postici parvi in lineam procurvam, oculi duo antici reliquis majores inter se contigui vel subcontigui. Pars labialis apice haud attenuata, recte secta et subquadrata. Chelarum unguis gracilis, longissimus, margo inferior sulci serie denticulata tenuissima munitus. Pedes mediocres, saltem femoribus robustis, antici fere mutici, postici, præsertim tibiis et metatarsis, numerose aculeati, patellis anticis insigniter longis. Mamillæ inferiores longissimæ a reliquis mamillis remotæ, ad basin spatio diametro mamillæ latiore a sese sejunctæ, sat graciles, articulo basali cylindrato intus apicem fusula grossa denticuliformi munito, articulo apicali multo brevior et subulato sed fusulis longissimis et penicillatis ornato; mamillæ mediæ graciles breviores quam articulo basilari mamillarum inferiorum, mamillæ superiores vix longiores quam mediæ, cylindratae.

Ce genre remarquable se distingue des autres *Drassidæ* par ses yeux, au nombre de six, disposés comme ceux des *Dysderidæ*. Ses filières ont exactement la disposition de celles des *Zimiris* de la famille précédente.

1. **L. senoculatum**, n. sp. (pl. 9, fig. 16-17). — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax ovatus, sat convexus, fulvo-rufescens, laevis et nitidus. Oculi postici æqui, in lineam leviter procurvam, mediæ a laterilibus haud separati sed inter se spatio diametro oculo paulo latiore distantes. Oculi antici reliquis plus triplo majores, rotundi et inter se juxta contigui. Clypeus oculis anticis circiter æquilatus. Abdomen bre-

viter-ovatum. Sternum, partes oris pedesque fulvo-ravida. Pedes antici posticis paulo longiores, coxis et patellis insigniter longis (patellis tibiis fere aequilongis), tarsis gracilibus et metatarsis vix brevioribus. Pedes quatuor antici mutici, patellis, tibiis metatarsisque subtus pilis longis, tenuibus et curvatis parce vestiti, pedes postici tibiis metatarsisque numerose aculeatis, tarsis inferne rude setosis. Pedes-maxillares longi, apice infuscati; femore sat longo et curvato, ad basin compresso, ad apicem incrassato et supra pluriaculeato; patella paulo longiore quam latiore, leviter ovata; tibia patella paulo longiore, apicem versus sensim ampliata, extus ad apicem apophysibus parvis binis instructa: apophysi 1^a robusta, intus valde uncata, apice truncata, fulva et leviter malleiformi, apophysi 2^a graciliore sed obtusa, antice secundum tarsum oblique directa; tarso mediocri, anguste ovato; bulbo simplici, ovato, plano, rufulo-marginato.

♀. Long. 4—4,5 mill. — Mari subsimilis. Abdomen supra cinereum in parte prima linea longitudinali et utrinque punctis binis, in parte secunda arcubus transversis dilutioribus, parum expressis, notatum, subtus omnino albidum, pilis longis pronis, leviter lanceolatis, albis micante-tinctis obtectum. Pedes robusti, antici posticis haud longiores, femoribus cunctis supra aculeatis. Plaga vulvæ magna, rufula, leviter convexa et parce pilosa, antice rotunda, postice, ad rimam epigasteris, late truncata et in medio minute marginata.

Forêt de Catuche, près Caracas!, Colonie Tovar!. — Dans les parties les plus sombres et les plus humides des forêts, dans les détritux au pied des arbres.

2. **L. valencianum**, n. sp. (pl. 9, fig. 18). — ♂. Long. 3 mill. — A precedente, cui affinis est, differt oculis posticis in lineam magis procurvam, mediis lateralibus evidenter minoribus, a lateralibus haud separatis, sed inter se spatio diametro oculo duplo latiore distantibus, oculis anticis inter se anguste separatis; abdomine omnino albo, pedum femoribus aculeis debilibus supra instructis, pedibus-maxillaribus brevioribus et crassioribus, tibia patella brevior et latior, apophysibus parvis binis extus armata; apophysi prima valde uncata apice nigra et oblique truncata, apophysi 2^a gracili sed obtusa magis divaricata, tarso majore, longe ovato.

Forêt de San-Esteban!, Valencia!.

Gen. **Tricongius**, nov. gen.

Cephalothorax humilis, brevis et latus, postice late truncatus, antice leviter et sensim attenuatus, fronte late et obtuse truncata, stria thoracica carens. Oculi antici inter se appropinquati, in lineam subrectam vix procurvam, medii lateralibus plus quadruplo minores, punctiformes. Oculi postici parvi, inter se late et fere æque distantes, in lineam subrectam (vix recurvam), parum remotam et linea antica multo latiore. Area oculorum mediorum multo latior quam longior et antice quam postice duplo angustior. Clypeus angustissimus. Chelæ robustæ. Pars labialis paulo longior quam latior, apice recte secta et dimidium laminarum vix attingens. Sternum longe ovatum, planum. Pedes breves et robusti, femoribus clavatis. Mamillæ inferiores mediocres, a mediis haud distantes, superioribus tantum $1/3$ longiores.

3. **T. collinus**, n. sp. (pl. 9, fig. 19-20). — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, in medio confuse dilutior, anguste nigricante-marginatus, lævis, pilis albidis longis et pronis parce vestitus. Oculi antici fere æquidistantes et spatiis diametro mediorum minutissimorum haud latioribus a sese distantes. Oculi postici fere æquidistantes et spatiis diametro oculo saltem triplo latioribus inter se distantes, oculi medii lateralibus minores. Abdomen breviter ovatum, supra nigricans et longe sericeo-pubescent, subtus dilutius et testaceum. Mamillæ testacæ. Sternum læve, pallide fusco-rufescens. Pedes breves et robusti, femoribus latis et clavatis, fulvo-ravidi, antici, femoribus exceptis, valde infuscati, pedes quatuor antici fere mutici, metatarsis tarsisque leviter scopulatis, pedes postici femoribus supra, tibiis metatarsisque et subtus et in lateribus, numerose aculeati. Plaga vulvæ rufula, lævis, longior quam latior et subparallela, striis duabus profundis, inter se appropinquatis, et partem mediam angustam limitantibus, marginem anteriorem plagam haud attingentibus et antice singulartiter et minute foveolatis, notata.

♂. Long. 2,5 mill. — Feminae similis. Pedes-maxillares fulvi apice infuscati, breves et validi; femore robusto; patella haud longiore quam latiore; tibia patella brevior, extus ad apicem apophysi fusca articulo longiore, antice recte directa, acuta, in parte apicali longe et oblique secta, instructa; tarso magno, reliquis articulis cunctis haud multo brevior, late ovato et attenuato; bulbo simplici, plano, ovato, fulvo et nigro-marginato.

Caracas !. — Sur les collines sèches, au pied des plantes.

4. *Melanophora (Prothesima) Ernsti*, n. sp. (pl. 9, fig. 21-22).

— ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax laevis et nitidus, obscure fusco-piceus, subniger. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus saltem $1/3$ minores, a lateralibus haud separati sed inter se spatio diametrum oculum circiter aequante sejuncti. Oculi postici in lineam subrectam (vix procurvam), fere aequidistantes et spatiis diametro oculo paulo angustioribus separati, medii lateralibus paulo majores et leviter angulosi. Clypeus oculis lateralibus anticis vix angustior. Abdomen nigricans, subtus dilutius et obscure testaceum, breviter sericeo-pilosum. Sternum laeve, planum, fulvo-olivaceum. Pedes breves et robusti, fusco-olivacei, coxis femoribusque ad basin dilutioribus, metatarsis tarsisque leviter ferrugineis. Tibiae quatuor anticae metatarsique 1^i paris muticae. Metatarsus 1^i paris subtus ad basin aculeis debilibus munitus. Tibiae metatarsique postici numerose aculeati. Tarsi metatarsique haud scopulati, rare pilosi, sed ungues fasciculati. Plaga genitalis rufula, levis, magna, multo longior quam latior et subparallela, antice posticeque rotunda, in parte prima foveola cordiformi postice acuta, in parte secunda maculis rotundis binis geminatis obscurioribus notata.

♂. Long. 4,8 mill. — Feminae similis. Pedes-maxillares olivacei; femore compresso, subparallelo, subtus haud inflato; patella tibiaque circiter aequilongis et paulo longioribus quam latioribus; tibia extus ad apicem apophysi robusta, depressa sed attenuata et subacuta, secundum tarsum ducta, et articulo brevior munita; tarso magno, breviter ovato et obtuso.

Caracas !.

5. *M. caracasana*, n. sp. (pl. 9, fig. 23-24). — ♀. Long. 5,2 mill.

— Cephalothorax laevis, nitidus, obscure fusco-piceus fere niger. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateribus triplo minores, a lateralibus haud separati sed inter se spatio diametro oculo latiore sejuncti. Oculi postici in lineam subrectam (vix procurvam), medii lateralibus majores, transversim triquetri et inter se contigui, sed a lateralibus anguste separati. Clypeus oculis lateralibus anticis angustior. Abdomen supra nigricans, subtus obscure testaceum, breviter sericeo-pubescent. Sternum laeve, planum, fusco-olivaceum, ad marginem obscurius. Pedes breves et robusti, fusco-olivacei, coxis dilutioribus. Tibiae quatuor anticae muticae. Metatarsi 1^i paris subtus aculeo basilari munitus. Metatarsus 2^i paris aculeis binis robustioribus subtus armatus. Tibiae metatarsique postici numerose aculeati. Tarsi metatarsique haud scopulati, simpliciter pilosi sed ungues fasciculati. Plaga genitalis fusco-

rnfula maxima, multo longior quam latior, antice pediculum attingente, postice leviter attenuata et obtusa, laevis et nitida sed antice (prope pediculum) stria arcuata profunda transversim secta.

♂. Long. 5 mill. — Feminae subsimilis. Pedes-maxillares olivacei apice infuscati; femore robusto, subparallelo, subtus laud inflato; patella tibiaque circiter aequilongis, haud multo longioribus quam latioribus; tibia extus ad apicem apophysi robusta et depressa sed attenuata et oblique divaricata articulo vix brevior munita; tarso ovato, magno, vix attenuato, reliquis articulis cunctis haud multo brevior, extus, prope basin, crasse marginato; bulbo sat complicato, apice stylo libero robusto, circulum formante, munito.

Caracas !, Petare !.

Gen. *Herpyllus* Hentz.

Typus generis : *Drassus varifer* Walck. (= *Herpyllus ecclesiasticus* Hentz).

6. **H. suavis**, n. sp. (pl. 9, fig. 25). — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax laevis, niger, in lateribus pilis longis simplicibus et pronis obscure olivaceis vestitus, in medio pilis plumosis albis, vittam latam designantibus, ornatus. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii paulo majores, inter se anguste separati, lateralibus subcontigui. Oculi postici in lineam valde procurvam, fere aequidistantes, medii lateralibus minores. Clypeus oculis lateralibus anticis saltem dimidio latior. Abdomen oblongum, atrum, obscure olivaceo-pubescent, in parte prima vitta longitudinali lata in medio leviter constricta et apice truncata, in parte altera macula magna rotunda albo-argenteo-plumosis, supra decoratum. Sternum, chelae pedesque nigra, tarsis paulo dilutioribus, sat longe sericeo-pubescentes, metatarsis tarsisque anticis sat dense scopulatis, tarsis posticis rare scopulatis; tibiis quatuor anticis inferne aculeis minutis biseriatis 2-1, metatarsis aculeis basilaribus binis tantum armatis, metatarsis tarsisque posticis sat numerose aculeatis. Partes oris et pedes-maxillares olivacea. Area vulvae rufula plana, antice late subrotunda, postice abrupte angustiore et parallela.

Colonie Tovar !.

Ab *A. varifero* Walck. (sp. mihi ignota), cui pictura corporis subsimilis est, verisimiliter distincta magnitudine plus triplo minore, etc.

7. **Echemus relucens**, n. sp. (pl. 9, fig. 26-27). — ♀. Long. 3,5 mill. — Cephalothorax ovatus, fulvo-rufescens, tenuiter fusco-

cinctus, levis, pilis longis et pronis albedo-sericeis parce vestitus. Area oculorum latitudinem frontalem evidenter angustior. Oculi antici sat magni et subæquales, in lineam valde procurvam, medii a lateralibus haud separati, inter se spatio diametro oculo plus duplo angustiore sejuncti. Oculi postici in lineam valde procurvam, medii lateralibus fere duplo majores, obtuse triquetri et intus recti, inter se contigui sed a lateralibus anguste separati. Clypeus oculis lateralibus anticis saltem duplo angustior. Abdomen oblongum, supra fusco-testaceum, præsertim postice, micante-tinctum, antice punctis minutis testaceis quatuor, parum distinctis, notatum, subtus omnino albo-testaceum, sat breviter et parum dense pubescens, sed ad marginem anticum pilis longioribus paucis munitum. Chelæ, sternum pedesque fulvo-ravida, sed pedes versus extremitates sensim obscuriores. Chelæ læves, sat convexæ. Sternum læve. Pedes haud scopulati. Pedes 1ⁱ paris omnino mutici. Pedes 2ⁱ paris metatarsis aculeis basilaribus binis muniti. Pedes postici tibiis metatarsisque sat numerose aculeati, sed aculeis dorsalibus carentibus. Tarsi antici metatarsis evidenter brevioribus. Plaga vulvæ magna, longior et subparallela, rufula, aream mediam latam læviorem stria profunda semicirculari circumdata includens.

♂. Long. 3 mill. — Feminae similis sed pedibus paulo longioribus. Pedes-maxillares fulvi, apice infuscati; femore robusto et leviter curvato; patella tibiaque circiter æquilongis et vix longioribus quam latioribus; tibia extus ad apicem apophysi fusca, longa (articulo fere duplo longiore), gracili recta et acuta, antice et paululum sursum directa instructa; tarso sat late ovato, apice attenuato et obtuso; bulbo convexo.

Valencia !.

8. **E. lubricus**, n. sp. (pl. 9, fig. 28-29). — ♀. Long. 3,8 mill. — Cephalothorax ovatus, fusco-rufescens, angustissime fusco-cinctus, area oculorum nigra, lævis pilis longis pronis albedo-sericeis conspersus. Area oculorum latitudinem frontalem fere totam occupans. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii lateralibus plus duplo majores, a lateralibus haud separati, sed inter se spatio dimidio diametro oculo latiore distantes. Oculi postici in lineam maxime procurvam, æqui et fere æquidantes, spatiis diametrum oculum saltem æquantibus separati, medii elongati et obliqui. Clypeus oculis lateribus anticis plus duplo angustior. Abdomen oblongum, atrum, pilis plumosis albidis vestitum. Chelæ rufule, læves, sat convexæ. Sternum pedesque fulvo-olivacea vel rufescentia. Sternum læve. Pedes quatuor antici tibiis inferne aculeis parvis binis submediis et apicalibus, et metatarsis aculeis basilaribus similibus

binis armati. Pedes postici tibiis metatarsisque sat numerose aculeatis et tibiis posticis aculeo dorsali subbasilari munitis. Metatarsi tarsique antici longi et subæqui, longe et rare scopulati, postici haud scopulati. Plaga vulvæ fusca, ovata, longior quam latior, fovea longitudinali testacea, antice leviter constricta et marginata, postice anguste producta, impressa.

♂. Long. 3,5 mill. — Feminae subsimilis, sed pedibus longioribus. Pedes-maxillares fulvi, apice infuscati; femore leviter curvato, ad basin compresso, supra aculeis paucis munito; patella paulo longiore quam latiore; tibia patella brevior, paulo latiore quam longiore, extus, ad angulum inferiorem apophysi fulva brevi, lata et subrotunda armata; tarso magno, ovato, tibia et patella simul sumptis multo longiore, apice longe attenuato et bulbum multo superante.

Colonie Tovar!.

Des deux espèces que j'ai observées au Venezuela, la première, *E. relucens* E. Sim., est tout à fait normale et même voisine des espèces européennes, principalement de *E. mollis* Cambr.; la seconde, *E. lubricus* E. Sim., par contre est un peu anormale, ses yeux de la seconde ligne sont relativement assez espacés, même les médians, ce qui indique une tendance vers le genre *Megamyrmeceum* Reuss.

Gen. **Laronia**, nov. gen.

Cephalothorax ovatus, sat convexus, fronte lata, stria brevissima punctiformi. Oculi antici inter se appropinquati, in lineam leviter procurvam, subæquales (*rufithorax* E. Sim.) vel medii minores (*variegata* E. Sim.). Oculi postici in lineam recurvam, linea antica latiore, æquidistantes, medii lateralibus minores. Clypeus oculis anticis latior. Chelæ ad basin convexæ dein leviter depressæ, interdum intus carinatae, margine sulci inferiore dentibus obtusissimis vel lobis contiguis trinis munito, ungue mediocri breviter sinuoso. Pars labialis multo longior quam latior, ad basin atque ad apicem attenuata. Laminæ longæ, paululum attenuatæ atque obtusæ, evidenter arcuatæ. Pedes sat breves, aculeati, haud scopulati, tarsis subtus aculeis vel setis spiniformibus, biserialim ordinatis, munitis.

9. **L. rufithorax**, n. sp. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax late fulvo-aurantiacus, nigro-marginatus, subtiliter coriaceus et setis nigris longis et erectis conspersus. Oculi antici subæquales (medii vix majores), medii a lateralibus subcontigui sed inter se spatio diametrum

oculum circiter æquante separati. Oculi medii postici inter se quam a lateralibus evidentissime remotiores. Abdomen breviter ovatum, supra nigrum, in parte prima maculis albo-testaceis quatuor (duabus anticis aliis multo majoribus elongatis et obliquis) et prope medium vitta transversa sinuosa, in medio angusta, utrinque in lateribus valde ampliata, subtus regione epigasteris fusca, regione ventrali in parte basali albo-testacea medio infuscata, in parte apicali nigra. Mamillæ testaceæ. Sternum, partes oris cheleque fulvo-ravida, laminæ, ad marginem exteriorum, setis validis nigris et erectis instructæ. Sternum sublæve. Chelæ validæ, coriaceæ, intus convexæ, carinatae et setis rigidis hirsutæ. Pedes flavo-rufuli, femoribus, præsertim anticis, et tarsis quatuor anticis fuscis; tibiis metatarsisque cunctis aculeis seriatis numerosis sed debilibus armatis. Pedes-maxillares fulvi; femore curvato et robusto; patella subquadrata; tibia patella brevior extus ad apicem apophysi sat gracili, antice directa et apice minute uncata instructa; tarso sat magno, ovato, apice subacuminato, setis spiniformibus consperso; bulbo simplici sat convexo.

Valencia ! (1).

Familia PALPIMANIDÆ.

Gen. *Otiothops* Mac Leay.

Les *Otiothops* se trouvent sous les pierres et les souches; leur démarche est assez lente et rappelle complètement celle des *Palpimanus*.

(1) Je possède une seconde espèce de ce genre :

L. variegata, n. sp. — ♀. Long. 8,7 mill. — (Pl. 9, fig. 30) — Cephalo-thorax fusco-purpureus, opacus, lineis radiantibus obscurioribus, medium haud attingentibus, anticis latioribus notatus. Oculi medii antici lateralibus minores. Oculi postici inter se late et fere æque separati. Abdomen longe oblongum, subcylindratum, fusco-testaceum, parce setosum, in parte prima utrinque vitta transversa abbreviata, prope medium vitta latiore, extus late et angulata-ampliata, dein maculis minoribus transversim lunatis albo-testaceis decoratum, subtus obscure fulvo-testaceum, antice posticeque infuscatum. Manillæ fuscae. Sternum fusco-rufulum nitidum. Partes oris infuscatæ, laminæ ad marginem exteriorum setis spiniformibus instructæ. Chelæ fusco-rufule, transversim leviter et inordinate rugatæ, ad basin convexæ et prominentes, dein leviter depressæ, intus setis spiniformibus validis munitæ. Pedes fusco-rufescentes, tarsis anticis fere nigris, parce setosi, tibiis metatarsisque anticis inferne aculeis parvis 3-3 instructis. Plaga vulvæ fusca, tenuissime marginata, cordiformi, prope medium obtusissime nigro-bicostata.

Banda oriental del Uruguay (Berg).

1. *O. lapidicola*, n. sp. — ♀. Long. 5,8 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, tenuiter et crebre coriaceo-rugosus et parce cinereo-pilosus. Oculi medii postici plani, breviter ovati atque obliqui, inter se angustissime sed distincte separati. Medii antici posticis circiter $\frac{1}{3}$ majores, nigri, convexi et rotundi. Clypeus area mediorum paulo latior. Abdomen oblongum, atro-testaceum, subtus dilutius, sericeo-pubescent, plagula epigasteris rufula, postice truncata et levissime emarginata, nitida, antice transversim striolata. Sternum nigro-rufescens, uniformiter granosum. Chelæ parce rugosæ, extus subtiliter carinatæ. Pedes ut in *O. amazonico* E. Sim., antici rufo-castanei, reliqui luridi.

♂. Long. 5 mill. — Pedum-maxillarium femur sat gracile et curvatum; patella parva nodiformis; tibia patella crassior et longior, superne visa subquadrata sed intus quam extus convexior; tarsus tibia cum patella simul sumptis longior, angustus, teretiusculus, apice subacutus et bulbum superans; bulbus magnus, globosus et nitidus, ad basin apophysi fusca longissima antice, secundum marginem exteriorem ducta, leviter flexuoso-angulosa et apice intus incurva.

Caracas !, San-Esteban !, Colonie Tovar !.

Ab *O. amazonico* E. Sim., cui affinis est, cephalothorace paulo longiore, oculis posticis majoribus et inter se subcontiguïs, chelis haud transversim rugatis distinctus.

2. *O. brevis*, n. sp. — ♀. Long. 4,2 mill. — A precedente, cui proximus est, differt cephalothorace paulo brevior et postice paulo convexiore, oculis posticis inter se juxta contiguïs (oculum singulum fere formantibus), sterno grossius rugoso-granuloso sed area media sublævi munito, chelis parce transversim rugatis, plagula epigasteris postice attenuata et rotunda, nitida sed antice et postice transversim striolata, pedibus obscurius rufescentibus.

♂. Pedes-maxillares fulvi, tibia rufula, tarso nigro; tibia patella multo longiore et crassiore utrinque valde convexo et subgloboso; tarso minuto, tibia multo angustiore haud longiore; bulbo depresso, apophys apicali acutissima et uncata instructo.

Corosál !, San-Esteban !.

Familia ZODARIIDÆ.

1. *Storena Hasselti* E. Sim. — *Storena spiræfera* Van Hasselt, *Tijds. v. Entom.*, XXX, p. 227 (non *Habronestes spiræfer* L. Koch). —

♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax ovatus, convexus, niger, subtiliter coriaceus atque opacus, antice leviter deplanatus et subtiliter transversim striolatus, parte cephalica stria longitudinali superficiali notata. Oculi quatuor antici in lineam sat procurvam, fere æque et sat anguste separati, medii lateralibus minores. Oculi quatuor postici in lineam latam vix procurvam, æqui, medii inter se appropinquati sed a lateralibus latissime remoti. Oculi quatuor medii aream trapeziformem (antice angustiore), vix longiorem quam latiore, occupantes, antici posticis multo minores. Clypeus verticalis planus, area oculorum latior. Chelæ robustæ, subtiliter coriaceæ, nigræ, apice dilutiores. Partes oris sternumque fusco-olivacea, lævia et nitida. Abdomen oblongum supra nigrum, maculis flavidis sat magnis decoratum : maculis sex biseriatis (quatuor anticis oblongo-longitudinalibus, reliquis duabus transversis) et postice macula transversa vel subquadrata, subtus pallide testaceum regione epigasteris rufescente, regione ventrali anguste nigro-limbata et postice, ante mamillas, sat late nigricante-maculata. Tuber anale manillæque testacea. Pedes sat breves, coxis femoribusque cunctis tibiisque anticis pallide luteis, reliquis articulis aurantiacis, pedes antici parcissime et minute, postici numerose et valide aculeati. Pedes-maxillares obscure fusco olivacei subnigri ; femore compresso et leviter curvato ; patella convexa, vix longiore quam latiore ; tibia patella brevior, transversa, extus, ad marginem superiorem, leviter ampliata et apophysi parva, gracili et curvata instructa ; tarso magno, late ovato atque acuminato ; bulbo magno et valde complicato intus stylo libero circumdato.

Catuche!, San-Esteban !, la Cumbre de Valencia !

Décrit, par Van Hasselt, de l'île de Curaçao.

Gen. **Leprolochus**, nov. gen.

Cephalothorax fere *Storenæ* sed fronte magis prominente, haud attenuata, rotunda, aculeis validis seriem transversam, sub oculis mediis anticis sitam, formantibus, insigniter armata. Oculi antici subæquales, lineam valde procurvam semicircularem designantes, medii a sese subcontigui sed a lateralibus late remoti. Oculi postici in lineam validissime procurvam, medii a lateralibus quam inter se multo remotiores, laterales postici cum mediis anticis lineam transversam subrectam formantes. Oculi medii trapezium fere duplo longius quam latius occupantes. Oculi laterales spatio oculo non multo latiore inter se distantes. Clypeus area oculorum multo latior, planus sed valde retro obliquus.

Chelæ et partes oris *Storenæ*. Sternum leviter convexum, postice attenuatum sed obtusum et coxæ posticæ inter se anguste distantes. Pedes 4, 3, 2, 1, sat robusti, sed metatarsis tarsisque gracilibus. cuncti numerose aculeati; tarsis longissimis, anticis metatarsis haud breviores. Mamillæ inferiores graciles teretes, et longæ, contiguæ sed fere usque ad basin liberæ, mamillæ superiores inferioribus plus duplo breviores, mediæ obsoletæ vel nullæ.

Les *Leptochus* offrent une certaine analogie par leur armature frontale avec les *Cyrioceta* E. Sim., de la famille des *Agelenidæ* (type : *Drassus spinifer* Nicolet; — cf. E. Sim., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 219).

2. **L. spinifrons**, n. sp. (pl. 9, fig. 34). — ♀ (pulla). Long. 3 mill. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, fusco-rufescens, parte cephalica vitta latissima dilutior, postice leviter attenuata oblecta, linea aculeata frontali ex aculeis octo validis et subacutis (mediis lateralibus paulo longioribus) composita. Abdomen breviter ovatum, supra atro-violaceum, macula media accentiformi utrinque maculis ovatis trinis obscure lividis et postice, supra mamillas, macula albo-testacea ornatum, parce et crasse albo-pilosum. Mamillæ venterque albido-testacei. Chelæ fusco-rufule. Sternum, partes oris pedesque pallide lurida, aculeis pedum nigris et numerosis.

La Guaira!.

J'ai observé cette espèce courant sur le sol avec une extrême agilité dans un endroit découvert et très chaud.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 9.

- Fig. 1. *Œcobius navus* Blackw. — Yeux vus en dessus.
 2. *Œcobius concinnus* E. Sim. — Yeux vus en dessus.
 3. *Œcobius petionius* E. Sim. — Yeux vus en dessus.
 4. *Œcobius putus* Cambr. — Yeux vus en dessus.
 5. *Auximus plugiatus* E. Sim. — Épigyne.
 6. *Auximus crinitus* E. Sim. — Épigyne.
 7. *Thallumetus satux* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.
 8. *Amaurobius (Titanæca) patellaris* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle en dessus.
 9. *Dysderina armata* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle.

Fig. 10. *Cinctomorpha puberula* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

10 a. Id. id. — Extrémité du bulbe plus grossie.

11. *Oonopinus aurantiacus* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

12. *Orchestina saltabunda* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

13. *Scytodes guttipes* E. Sim. — Tarse en bulbe de la patte-mâchoire du mâle de profil.

14. *Nops sublævis* E. Sim. — Tarse en bulbe de profil.

15. *Caponina longipes* E. Sim. — Tarse en bulbe de profil.

16. *Lygromma senoculatum* E. Sim. — Front et yeux vus en dessus.

17. Id. id. — Tibia de la patte-mâchoire du mâle en dessus.

18. *Lygromma valencianum* E. Sim. — Tibia de la patte-mâchoire du mâle en dessus.

19. *Tricongius collinus* E. Sim. — Patella et tibia de la patte-mâchoire du mâle de profil.

20. Id. id. — Épigyne.

21. *Melanophora Ernsti* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

22. Id. id. — Épigyne.

23. *Melanophora caracasana* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

24. Id. id. — Épigyne.

25. *Herpyllus suavis* E. Sim. — Épigyne.

26. *Echemus relucens* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

27. Id. id. — Épigyne.

28. *Echemus lubricus* E. Sim. — Patte-mâchoire du mâle de profil.

29. Id. id. — Épigyne.

30. *Laronia variegata* E. Sim. — Marge inférieure de la chélicère.

31. *Leprolochus spinifrons* E. Sim. — Front et yeux vus en dessus.

